

以下の質問は向精神薬の治療開始後に出現した性機能障害に関するものです

A あなたは内服治療を始めた後に、性的な活動面での変化（興奮、勃起、射精）を自覚したことがありますか

- 1 はい
- 2 いいえ

1. 性行為に関する欲求や関心の低下を自覚しますか

- 0 いいえ、全くありません
- 1 少し自覚しています
- 2 中程度に自覚しています
- 3 非常に強く自覚しています 欲求も関心もほとんど全くありません

2. 射精に至るのに時間がかかることを自覚していますか

- 0 いいえ、全くありません
- 1 少し自覚しています
- 2 中程度に自覚しています
- 3 射精は可能ですが、非常に強く自覚しています

3. 性行為を始めたとしても射精できないということがありますか

- 0 いいえ
- 1 時々ありました。25%以下の頻度です
- 2 しばしばありました。25%から75%の頻度です
- 3 ほとんどいつもありました。75%以上の頻度です

4. 性行為を始めたとしても勃起すること、勃起を維持することが困難であった経験がありますか

- 0 いいえ
- 1 時々ありました。25%以下の頻度です
- 2 しばしばありました。25%から75%の頻度です
- 3 ほとんどいつもありました。75%以上の頻度です

5 こうした性機能面での変化にあなたはどれくらい耐えられますか

- 0 全く支障はありません
- 1 そのせいで困難を感じる、ということはありません。
- 2 そのせいで治療を中断しようと思うことはありませんが、かなり困難を感じています。
- 3 パートナーとの関係が障害されています。重大な支障があります。そのせいで治療を中断しようと考えていますし、パートナーとの関係が深刻に障害されています。